



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
B型肝炎	ユニバーサル			①	②					③		(注1)												
	母子感染予防	①	②							③														
ロタウイルス	1価			①	②	(注2)																		
	5価			①	②	③	(注3)																	
肺炎球菌 (PCV13、PCV15)	不活化			①	②	③					④												(注4)	
5種混合 (DPT-IPV-Hib)	不活化			①	②	③					④						7.5歳まで							
3種混合 (DPT)	不活化																① (注5)					② 11-12歳 (注6)		
2種混合 (DT)	不活化																					① 11歳	12歳	
ポリオ (IPV)	不活化																① (注7)							
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合	不活化			①	②	③					④												(注8)	
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合	不活化			①	②	③					④						7.5歳まで							
BCG	生									①														
麻疹・風疹混合 (MR)	生																					② (注9)		
水痘	生																						(注10)	
おたふくかぜ	生																					② (注11)		
日本脳炎	不活化										生後6か月から接種可能						① ② ③	7.5歳まで				④ 9-12歳		
インフルエンザ	不活化										生後6か月から接種可能						毎年 (10、11月などに) ① ②						13歳以上①	
新型コロナウイルス	mRNA																							
ヒトパピローマウイルス (HPV)	9価	不活化																			(注12)	小6	中1① ② (注13)	中2～高1相当 (注14)
	2価・4価	不活化																			(注12)	小6	中1 ① ② ③ (注13)	中2～高1相当 (注14)
ワクチン	種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期